

# Farmasøytmateriell

## Sjekkliste for farmasøyt – Veiledning ved utlevering av Acitretin Orifarm.

Acitretin Orifarm tilhører legemiddelgruppen retinoider, som forårsaker alvorlige fosterskader. Fostereksponeering for Acitretin Orifarm, selv i korte perioder, gir en høy risiko for medfødte misdannelser og spontanabort.

**Acitretin Orifarm er derfor strengt kontraindisert ved graviditet og hos fertile kvinner, med mindre alle vilkår i det graviditetsforebyggende programmet til Acitretin Orifarm er oppfylt.**

En negativ graviditetstest, forskrivning av resept og utlevering av Acitretin Orifarm bør ideelt sett skje på samme dag.

Dersom du får vite at en kvinne som behandles med Acitretin Orifarm har blitt gravid, skal hun få beskjed om at behandlingen må avsluttes umiddelbart, og straks henvises til forskrivende lege.

Dersom du får vite at en kvinnelig pasient har blitt gravid innen 3 år etter seponering av Acitretin Orifarm, skal hun henvises til forskrivende lege.

*Påminnelseskort for pasienter* gis til pasienten av legen ved første forskrivning. Kortet finnes tilgjengelig hos Felleskatalogen.no for hvert enkelt produkt.

Se preparatomtalen for mer informasjon om Acitretin Orifarm. Denne finnes hos Felleskatalogen.no (nettside eller app) eller på legemiddelsok.no.

**Som farmasøyt skal du kun utlevere Acitretin Orifarm etter å ha undersøkt følgende informasjon:**

<b>For fertile kvinner:</b>	<b>Sjekket/gitt informasjon (X)</b>
For å sikre regelmessig oppfølging, inkludert graviditetstesting skal resepten på Acitretin Orifarm være begrenset til 30 dagers bruk. Resepten må hentes ut innen 7 dager.	
<b>Alle pasienter bør få beskjed om:</b>	
at de aldri må gi Acitretin Orifarm til en annen person.	
at de skal returnere ubrukte kapsler til apoteket ved avsluttet behandling.	
at de ikke må gi blod under Acitretin Orifarm-behandling og i 3 år etter seponering, grunnet den potensielle risikoen for fosteret ved blodoverføring til en gravid mottaker.	