

PASIENTKORT

Viktig sikkerhetsinformasjon

ARIKAYCE liposomal 590 mg (amikacin) kan gi alvorlige bivirkninger.

Dette kan skje på et hvilket som helst tidspunkt under behandlingen.

Du kan få mer enn én bivirkning samtidig.

ARIKAYCE liposomal kan være forbundet med utvikling av en allergisk lungetilstand (allergisk alveolitt)

KONTAKT LEGE UMIDDELBART hvis du utvikler tegn eller symptomer som:

- Feber, hoste, forverring av åndenød, vekttap
- Lungetilstanden din forverres og går utover pustingene dine eller den generelle helsen din

Legen din kan komme til å gi deg andre legemidler for å forhindre mer alvorlige komplikasjoner og redusere symptomene dine.

Legen din kan bestemme at behandlingen din må stanses.

Viktig

- Ikke forsøk å diagnostisere eller behandle bivirkninger på egenhånd.
- **Ha dette kortet på deg til enhver tid**, spesielt når du reiser, når du skal til legevakten eller når du har time hos en annen lege.
- Sørg for at du sier fra til alt helsepersonell du er i kontakt med om at du er under behandling med ARIKAYCE liposomal, og vis dem dette kortet.
- Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt på dette kortet.

Startdato for
behandling med
ARIKAYCE liposomal