

Pasientkort – viktig sikkerhetsinformasjon

CIBINQO®
(abrocitinib)



Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning, se:

www.dmp.no/pasientmelding

Sikkerhetsinformasjon til deg om Cibinqo:

- Dette pasientkortet inneholder viktig sikkerhetsinformasjon du bør være oppmerksom på – før og under behandling med Cibinqo.
- For mer informasjon, se Cibinqo pakningsvedlegg i pakningen eller på www.felleskatalogen.no.
- Dersom du er usikker på denne informasjonen, be lege/apotek om å forklare det for deg.

Ha dette kortet med deg og vis det til helsepersonell som er involvert i din medisinske behandling, for eksempel farmasøyt eller legevaktslege.

Du bør kjenne til bivirkningene og sikkerhetsinformasjonen listet opp nedenfor.

Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger.

Hva Cibinqo er og hva det brukes mot

Cibinqo inneholder virkestoffet abrocitinib. Det tilhører en gruppe legemidler som kalles Janus-kinasehemmere, som bidrar til å redusere betennelse. Det virker ved å redusere aktiviteten til et enzym i kroppen som kalles “Janus-kinase”, som er involvert i betennelse.

Cibinqo brukes til å behandle voksne og ungdom fra 12 år og eldre som har moderat til alvorlig atopisk dermatitt, også kjent som atopisk eksem. Cibinqo reduserer kløe og betennelse i huden ved å redusere aktiviteten til Janus-kinaseenzymer. Dette kan igjen redusere søvnforstyrrelser og andre følger av atopisk eksem, f.eks. angst eller depresjon, og forbedrer dermed den generelle livskvaliteten.

Risiko for infeksjoner:

Snakk med lege eller apotek før og under behandling med Cibinqo dersom du:

- Får symptomer som feber, sår, føler deg mer sliten enn vanlig eller får problemer med tennene, da dette kan være tegn på infeksjon.

Vaksinasjon:

Snakk med lege eller apotek dersom du nylig har fått eller planlegger å ta en vaksine (immunisering). Enkelte levende vaksiner (som MMR-vaksine, gulfebervaksine, BCG) skal unngås under eller like før behandling med Cibinco.

Risiko for blodpropp i blodårer (vener) eller lunger

Snakk med lege eller apotek dersom du:

- Får plutselig kortpustethet eller pusteproblemer, brystmerter eller smerter i øvre del av ryggen, hevelse i bein eller armer, beinsmerter eller -ømheter, eller rødhet eller misfarging i bein eller armer, da dette kan være tegn på blodpropp i blodårene.

Risiko for hjertesykdom

Snakk med lege eller apotek før og under behandling dersom du:

- Opplever alvorlige brystmerter eller tetthet (som kan spre seg til armer, kjeve, nakke og rygg), kortpustethet, kaldsvette, ørhet eller plutselig svimmelhet, da dette kan være tegn på hjerteinfarkt.

Risiko for kreft

Ikke-melanom hudkreft er observert hos pasienter som tar Cibinqo. Legen din kan anbefale at huden din undersøkes med jevne mellomrom så lenge du bruker Cibinqo. Du må informere lege dersom nye hudlesjoner (unormale hudforandringer) oppstår under eller etter behandlingen, eller hvis eksisterende hudlesjoner endrer utseende.

Laborrietester/blodprøver

Legen din vil ta blodprøver (inkludert test for høyt kolesterol) av deg før og under Cibinqo-behandlingen, og kan justere behandlingen om nødvendig.

Prevensjon, graviditet og amming

Cibinqo skal IKKE brukes under graviditet og amming.

Dersom du er en fertil kvinne, bør du bruke sikker prevensjon under behandling med Cibinqo, og i minst én måned etter den siste dosen. Legen kan gi deg råd om egnede prevensjonsmetoder.

Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Annen informasjon (vennligst fyll ut):

Ditt navn:

Lege (forskriver av Cibinqo):

Tlf. lege:

Datoen du startet på Cibinqo: