

**ILUVIEN®**

## **PASIENTOPPLÆRINGSMATERIELL VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON**



Du kan få tilgang til en lydfil med denne informasjonen ved å lese av QR-koden i øvre høyre hjørne på dette skrivet med en smarttelefon.

Du kan også be om en papirversjon med stor skrift hos øyelegen eller fra Alimera ved hjelp av kontaktopplysningene nedenfor.

### **DET ER VIKTIG Å VÆRE OPPMERKSOM PÅ MULIGE FORANDRINGER I ØYET DITT ETTER INJEKSJON AV ILUVIEN**

I sjeldne tilfeller kan injeksjonen medføre en infeksjon i øyet eller netthinneforandringer.

### **SØK LEGEHJELP UMIDDELBART HVIS DU OPPLEVER NOEN AV FØLGENDE TEGN ELLER SYMPTOMER:**

- Uklart eller redusert syn
- Øyesmerter
- Forverret rødhet i øyet
- En følelse av prikker foran øynene
- Økt følsomhet for lys etter injeksjonen
- Blinkende lys
- Delvis blokkert syn
- Synsforvrengning eller andre synsforstyrrelser
- Hevelse i øyets overflate (hornhinnehevelse)
- Endring i utseendet av øyets fremre del

Injeksjon av ILUVIEN kan også medføre følgende:

- Økt trykk i øyet
- Uklarhet i øyets naturlige linse (grå stær)

Du må derfor møte til alle besøk ved klinikken for å bli kontrollert av legen regelmessig.

Les pakningsvedlegget til ILUVIEN for fullstendig sikkerhetsinformasjon.

Dette kan hentes på <https://www.felleskatalogen.no>

Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget

Lege .....

Tlf. ....

Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: [www.legemiddelverket.no/pasientmelding](http://www.legemiddelverket.no/pasientmelding)

Bivirkninger kan også meldes til:  
Alimera Sciences Europe Limited  
E-post: [pvalimerasciences@alimerasciences.com](mailto:pvalimerasciences@alimerasciences.com)