

Min informasjon:

Navn på lege:

.....
.....

Tlf. nr. lege:

.....

Mitt navn:

.....
.....

Mitt tlf. nr.:

.....

Kontaktperson ved nødstilfelle:

.....
.....

Tlf.nr. til kontaktperson:

.....

Firmaets kontaktinformasjon:

Representant på vegne av

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
(www.cheplapharm.com):

ProPharma Group Sweden AB

E-post:

cheplapharm@eu.propharmagroup.com

Telefon: +46 8215445

Melding av bivirkninger:

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget eller på dette kortet. Du kan melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter:

www.dmp.no/pasientmelding.

Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Versjon 4.0



Pasientkort

Lariam[®] 250 mg

(meflokin)

På dette kortet finner du viktig informasjon om mulige psykiske bivirkninger ved bruk av Lariam.

Les også pakningsvedlegget som ligger i pakningen - det inneholder fullstendig informasjon om Lariam, også om øvrige bivirkninger legemidlet kan ha.

Pakningsvedlegget kan også søkes opp på www.felleskatalogen.no

Ha alltid med deg dette kortet.

Vis dette kortet dersom du oppsøker lege.

Hva bør jeg vite om Lariam?

- Lariam er et reseptpliktig legemiddel som brukes for å forebygge og behandle malaria. Malaria er en livstruende infeksjon. Lariam virker ikke ved alle typer malaria.
- Bruk Lariam slik legen har forklart deg: før avreise, under reisen og etter at du er ute av malariaområdet.

Bruk **ikke** Lariam dersom du har eller noen gang har hatt:

- depresjon, selvmordstanker, selvskadende atferd
- andre psykiske problemer inkludert angstlidelser, schizofreni eller psykose (mister kontakt med virkeligheten)
- kramper (anfall eller krampeanfall)
- allergi overfor kinin, kinidin, Lariam eller noen av innholdsstoffene
- alvorlige leverproblemer
- Blackwater feber (en komplikasjon av malaria som påvirker blodet og nyrene).

Bruk ikke Lariam dersom du samtidig tar en malariamedisin kalt: Halofantrin.

Lariam kan forårsake alvorlige psykiske problemer hos noen personer. Informer legen umiddelbart dersom du opplever noe av det følgende når du bruker Lariam:

- selvmordstanker
- selvskadende adferd
- alvorlig angst
- føler mistenksomhet overfor andre
- ser eller hører ting som ikke er der

- mareritt/unnormale drømmer
- søvnløshet
- depresjon
- føler rastløshet
- uvanlig adferd eller føler deg forvirret

Oppsøk lege umiddelbart dersom du opplever alvorlige psykiske problemer ved bruk av Lariam. Behandlingen med Lariam kan erstattes med et annet legemiddel for å forebygge malaria dersom du opplever noe av det som er nevnt ovenfor.