


Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding
Du kan også melde fra om bivirkninger til AS Kalceks ansvarlige person for Pharmacovigilance:
vigilance@grindeks.lv
Tel: +371 22038854

Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Hvordan bruke Natriumoksybat Kalceks

Esken med Natriumoksybat Kalceks inneholder én flaske med Natriumoksybat Kalceks løsning, et mellomstykke, en gradert doseringssprøyte med barnesikret lokk til tillaging og oppbevaring av to doser som tas om natten, og pakningvedlegget for Natriumoksybat Kalceks.



Vær vennlig å lese pakningsvedlegget for viktig tilleggsm informasjon før du tar den første dosen med Natriumoksybat Kalceks. Bruk alltid Natriumoksybat Kalceks nøyaktig slik legen har fortalt deg. Pakningsvedlegget kan også søkes opp på Felleskatalogen.no

Kontakt legen hvis du har ytterligere spørsmål eller bekymringer om Natriumoksybat Kalceks

Patientbrosjyre V1. Akseptert av Statens legemiddelverk MMYYYY.

Forberedelse av Natriumoksybat Kalceks.

Du må gjøre begge dosene klare før du legger deg.

Trinn 1 (Figur 1)

Fjern flaskelokket ved å trykke ned mens du skrur lokket mot klokken (mot venstre). Etter å ha fjernet lokket settes flasken på en bordplate. Mens du holder flasken rett setter du inn mellomstykket i flaskehalsen. Dette behøver du bare å gjøre første gang flasken åpnes. Mellomstykket kan bli stående i flasken for senere bruk.


Figur 1



Trinn 2 (Figur 2)

Deretter settes spissen av doseringssprøyten inn i åpningen på flasken og trykkes hardt ned. Forsikre deg om at doseringssprøyten er tett festet.


Figur 2



Trinn 3 (Figur 3)

For å fylle sprøyten, vri flasken opp ned. Mens du holder sprøyten på plass, trekker du stemplet forsiktig ned og trekker medisinen til den foreskrevne dosen.


Figur 3



Trinn 4 (Figur 4)

Snu flasken riktig vei opp. Fjern sprøyten fra flaskeåpningen. Tøm legemidlet fra sprøyten over i et av doseringsbegrene ved å trykke ned stemplet. Gjenta dette trinnet for det andre doseringsbegeret. Tilsett deretter 60 ml vann i hvert doseringsbeger (60 ml er omtrent 4 spiseskjeer).

Figur 4



Trinn 5 (Figur 5)

Sett lokkene på doseringsbegrene og skru hvert lokk med klokken (til høyre) inntil det klikker og låser dem i en barnesikret posisjon. Skyll pipetten med vann.

Figur 5



Trinn 6 (Figur 6)

Like før du legger deg plasserer du de to begrene nærheten av sengen. Det kan være nødvendig å bruke en vekkeklokke slik at du våkner og kan ta den andre dosen, ikke tidligere enn 2,5 timer og ikke senere enn 4 timer etter den første dosen. Ta den første dosen når du legger deg. Fjern lokket fra det første doseringsbegeret ved å trykke ned det barnesikrede lokket og skru lokket mot klokken (mot venstre). Drikk hele innholdet mens du sitter i sengen, sett på lokket igjen og legg deg ned med én gang.

Figur 6



Trinn 7

Når du våkner 2,5 til 4 timer senere fjerner du lokket fra det andre doseringsbegeret. Mens du sitter i sengen drikker du hele den andre dosen rett før du legger deg ned for å fortsette å sove. Sett lokket tilbake på det andre doseringsbegeret.

For flere detaljer om informasjonen i denne brosjyre, vennligst les pakningsvedlegget i esken med Natriumoksybat Kalceks og ta kontakt med lege eller apotek.