

7. Er det andre viktige ting jeg skal vite når jeg bruker Natriumoksybat Kalceks?

- Ikke gi Natriumoksybat Kalceks videre til andre.
- Bruk kun den dosen legen din har forskrevet. Rådfør deg med legen dersom du tror dosen bør endres.
- Oppbevar alltid Natriumoksybat Kalceks i originalpakningen, på et trygt sted.
- Husk at det alltid skal gå 2 timer fra du sist spiste et måltid til du tar Natriumoksybat Kalceks
- Oppbevar Natriumoksybat Kalceks utilgjengelig for barn.
- Lever ubrukt legemiddel til apoteket.
- Kontakt legen umiddelbart dersom du får uvanlige symptomer når du bruker Natriumoksybat Kalceks, som f.eks. merkelige tanker, inkludert tanker om å skade andre.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter.

Du kan også melde fra om bivirkninger til AS Kalceks ansvarlige person for Pharmacovigilance:
vigilance@grindeks.lv
Tel: +371 22038854

Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Natriumoksybat Kalceks Ofte stilte spørsmål Informasjonshefte

Her finner du noen spørsmål som du kanskje har om Natriumoksybat Kalceks. Sørg for å kontakte helsepersonell hvis du har andre spørsmål, og les gjennom pakningsvedlegget som finnes i hver legemiddelpakning. Pakningsvedlegget kan også søkes opp på Felleskatalogen.no

1. Hva er Natriumoksybat Kalceks?

Natriumoksybat Kalceks® er en reseptpliktig mikstur som brukes til å behandle voksne som:

- hyppig faller i søvn på dagtid, og på uventede tidspunkt (narkolepsi);
- plutselig får svekkelse eller lammelse i muskler når de opplever sterke følelsesmessige reaksjoner (katapleksi)

2. Kan jeg drikke alkohol når jeg bruker Natriumoksybat Kalceks?

Nei, du må ikke drikke alkohol når du bruker Natriumoksybat Kalceks. Effektene av Natriumoksybat Kalceks kan øke, og du kan få pusteproblemer (hemming av pustefunksjonen) som kan være livstruende. Du kan også oppleve trengere tankegang og forvirring.

3. Hvilke alvorlige bivirkninger har Natriumoksybat Kalceks?

Pusteproblemer (hemming av pustefunksjonen)

Natriumoksybat Kalceks kan påvirke pustefunksjonen. Hvis du har problemer med pusten eller lungene skal du informere legen om dette før du begynner å bruke Natriumoksybat Kalceks. Hvis du er overvektig, er du også mer utsatt for hemming av pustefunksjonen. Du må ikke drikke alkohol, da dette også kan øke risikoen for hemming av pustefunksjonen. Hemming av pustefunksjonen kan være alvorlig og til og med dødelig.

Depresjon og selvmordstanker

Kontakt lege umiddelbart dersom du føler deg deprimert eller har tanker om å skade deg selv når du bruker Natriumoksybat Kalceks. Hvis du tidligere har hatt depresjon, må du også informere legen om dette.

Nedsatt grad av bevissthet

Fordi Natriumoksybat Kalceks virker direkte på hjernen, forårsaker det døsigheit og kan gi nedsatt grad av bevissthet. Dette kan føre til koma og være livstruende. Det er viktig at du ikke drikker alkohol når du bruker Natriumoksybat Kalceks. Du må ikke bruke andre legemidler som forårsaker døsigheit. Du må heller ikke kjøre bil eller bruke maskiner før det har gått minst 6 timer etter at du har tatt Natriumoksybat Kalceks.

Anfall

Natriumoksybat Kalceks kan forårsake anfall. Hvis du tidligere har hatt anfall, må du informere legen om dette før du bruker Natriumoksybat Kalceks.

Avhengighet/misbruk/feilbruk

Virkestoffet i Natriumoksybat Kalceks er gammahydroksybutyrat (GHB). GHB er et kjemisk stoff som kan misbrukes og brukes på feil måte. Legen vil derfor spørre spesielt om du har misbrukt narkotika tidligere. Misbruk og feil bruk av Natriumoksybat Kalceks er farlig og kan få livstruende konsekvenser. Dette er ikke alle bivirkningene som kan oppstå ved bruk av Natriumoksybat Kalceks. Rådfør deg med legen angående bivirkninger. Du kan også lese mer i pakningsvedlegget.

4. Er det trygt å bruke Natriumoksybat Kalceks samtidig med andre legemidler?

Som for alle legemidler, er det svært viktig at du informerer legen om hvilke andre legemidler du bruker, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Natriumoksybat Kalceks skal ikke brukes samtidig med legemidler som forårsaker døsigheit eller samtidig med smertestillende legemidler klassifisert som narkotika og som demper aktiviteten i sentralnervesystemet. Sørg for at du informerer legen hvis du bruker legemidler som påvirker aktiviteten i sentralnervesystemet (antidepresiver, valproat, topiramat, fenytoin eller ethosuksimid). Spør helsepersonellet om å få pasientkortet for Natriumoksybat Kalceks, som er til å ha med seg og minne deg på hvordan Natriumoksybat Kalceks skal brukes. Vis dette kortet til alle leger du går hos, slik at de vet at du bruker Natriumoksybat Kalceks, spesielt hvis de også forskriver andre legemidler til deg.

5. Hva gjør jeg dersom jeg ved et uhell tar mer enn den dosen som er forskrevet?

Hvis du tar for mye av Natriumoksybat Kalceks (overdose) skal du umiddelbart søke medisinsk hjelp. Dersom du tar for mye av Natriumoksybat Kalceks kan dette gi symptomer som uro, forvirring, nedsatt bevegelighet, nedsatt pustefunksjon, tåkesyn, kraftig svetting, hodepine, oppkast, nedsatt bevissthet som kan føre til koma og anfall. Ta med deg den merkede flasken med legemidlet, selv om den er tom. Dette kan hjelpe helsepersonellet med å behandle symptomene dine.

6. Hva hvis jeg plutselig slutter å ta Natriumoksybat Kalceks?

Dersom du plutselig slutter å ta Natriumoksybat Kalceks, kan du få abstinenser. Du kan oppleve at katapleksianfallene kommer tilbake, og i sjeldne tilfeller kan du få søvnloshet, hodepine, angst, svimmelhet, søvnproblemer, søvnighet, hallusinasjoner og unormal tankegang.