

Sikkerhetsinformasjon til helsepersonale

– Bruksanvisning for administrering av Nebido® (testosteronundekanoat)

Se oppdatert preparatomtale (SPC) og opplæringsmateriell på www.felleskatalogen.no.

Injeksjonsprosessen – steg for steg

- Ikke injiser kald oppløsning
- Som alle oljebaserte oppløsninger må Nebido injiseres kun intramuskulært og svært sakte
- Det anbefales å injisere Nebido over omtrent 2 minutter¹
- Når injeksjonsstedet er valgt, renses området med et antiseptisk middel
- Er det lite muskelmasse, må en klemme opp 2 til 3 folder av glutealmuskelen for å få meir volum og vev til å sette nålen i.
- Sett nålen inn i huden med en vinkel på 90° for å sikre at den sitter dypt i muskelen.
- Ta godt tak i sprøytesylindere med den ene hånden. Bruk den andre hånden til å trekke stampelet tilbake for å aspirere for blod.
 - Kommer det frem blod, må en ikke gå videre med injeksjonen. Ta nålen ut av pasienten umiddelbart og bytt den ut.
 - Gjenta injeksjonstrinnene forsiktig
- Dersom blod ikke aspireres, holdes nålen i posisjon for å unngå bevegelse
- Injiser svært sakte ved å trykke stampelet forsiktig ned og med jevn hastighet til legemiddelet er tilført (ideelt sett over 2 minutter)
- Om mulig bruker du den ledige hånden til å kjenne eller kontrollere for depotdannelse
- Trekk nålen tilbake

Pasienten observeres under og umiddelbart etter hver injeksjon av Nebido for å muliggjøre tidlig gjenkjenning av mulige tegn og symptomer som kan antyde pulmonal, oljemikroemboli (POME).¹

Risikoadministrasjon hos Nebido-behandlede pasienter

Nebido preparatet

Nebido er en oljeløsning som inneholder 1000 mg TU oppløst i 4 ml laksérolje.¹ Som alle oljeløsninger, må Nebido injiseres kun intramuskulært og svært sakte.¹ Intramuskulær injeksjon av et oljebasert preparat krever spesiell forsiktighet for å forhindre utilsiktet, direkte tilførsel av den oljebaserte løsningen til karsystemet.

Pulmonal oljemikroemboli

POME er en injeksjonsbasert reaksjon som er patofysiologisk relatert til fettembolisyndrom. Det kan oppstå etter direkte vaskulær eller lymfovaskulær tilførsel av oljebaserte preparater, som når lungene fra venesirkulasjonen og høyre hjerteklaff.

Pulmonal mikroemboli av oljeløsninger kan i sjeldne tilfeller føre til tegn og symptomer som: hoste (eller trang til å hoste), dyspné uvelhet, hyperhidrose, brystmerter, svimmelhet, parestesi eller synkope.¹

Disse reaksjonene kan oppstå under, eller umiddelbart etter injeksjonen, og er reversible.

Behandlingen er vanligvis støttende, f.eks. ved administrasjon av oksygentilskudd.¹

Noen ganger kan det være vanskelig å skille disse symptomene fra en allergisk reaksjon, som kan oppstå ved bruk av et injiserbart produkt. Det er rapportert om mistenkte anafylaktiske reaksjoner etter injeksjon med Nebido.¹

Melding av bivirkninger

Helsepersonell bes melde nye, uventede og alvorlige mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema: www.dmp.no/meldeskjema.

Referanser:

1. Nebido Preparatomtale

MER INFORMASJON FÅS VED HENVENDELSE TIL: Grünenthal Norway AS, C. J. Hambros Plass 2C, 0164 Oslo

DATO FOR FORBEREDELSE: Desember 2017

OPPDATERINGSDATO: Januar 2024

REF NR.: M-NEB-NO-01-24-0001

FULLSTENDIG FORSKRIVNINGSinFORMASJON FINNES I PREPARATOMTALEN.