
Odomzo® (sonidegib) kapsler påminnelseskort for helsepersonell

Odomzo® kan forårsake embryoføtal død eller alvorlige fosterskader når det gis til en gravid kvinne. Hedgehog (Hh)-signalveihemmere har vist seg å være embryotoksiske og/eller teratogene hos dyr.
Odomzo® må ikke brukes under graviditet.

Se vedlagt produktinformasjon som er relevant for ditt land, eller kontakt info.se@sunpharma.com.

Odomzo® er kontraindisert hos kvinner som er gravide eller ammer.

Se vedlagt lokal produktinformasjon som inneholder omfattende sikkerhetsinformasjon.

Minn pasientene som tar Odomzo® (sonidegib) kapsler om følgende:

- De ikke må bli gravide.
- De ikke må amme.
- De ikke må donere sæd.
- De ikke må ha ubeskyttet samleie, selv om de er kvinner som har gjennomgått sterilisering ELLER menn som har gjennomgått vasktomi.
- Kvinner i fertil alder alltid må bruke graviditetsforebyggende tiltak, for eksempel å avstå fra samleie ELLER bruke 2 anbefalte prevensjonsmetoder.
- Kvinnelige pasienter må ta en graviditetstest innen 7 dager før oppstart av Odomzo®-behandling og månedlig under behandlingen.

**HUSK Å GÅ IGJENNOM OG FYLLE UT ODOMZO®-SKJEMAET
'BEKREFTELSE PÅ RÅDGIVNING' I ODOMZO®-PASIENTBROSJYREN**

Husk også å be pasientene dine om å:

- Oppbevare legemidlet utilgjengelig for barn.
- Ikke gi kapslene til andre enn helsepersonell.
- Avhende alle ubrukte kapsler når behandlingen er avsluttet i samsvar med lokale krav (hvis mulig, for eksempel levere kapslene til apoteket eller legen).
- Avstå fra å gi blod mens de er under behandling, og i 20 måneder etter siste dose.

2 PREVENSJONSMETODER SKAL BRUKES, 1 FRA HVER KOLONNE

BARRIEREMETODER

- Kondom for menn
(med sæddrepende middel,
hvis tilgjengelig) **ELLER**
- Pessar med sæddrepende middel



SVÆRT SIKRE PREVENSJONSMETODER

- Intrauterint innlegg (spiral) **ELLER**
- Sterilisering **ELLER**
- Vasektomi