

# PENTHROX<sup>®</sup>

(metoksyfluran)

## Sjekkliste for administrering

Sikkerhetsinformasjon  Etter krav fra  
Direktoratet for  
medisinske produkter

Denne sjekklisten er av vesentlig betydning for å sikre trygg og effektiv bruk av metoksyfluran, samt hensiktsmessig håndtering av viktige utvalgte risikofaktorer.

### VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON TIL HELSEPERSONELL

#### Før bruk av metoksyfluran sjekk at pasienten ikke har:

- Kardiovaskulær ustabilitet
- Overfølsomhet overfor metoksyfluran, fluorinerte anestetika eller overfor noen av hjelpestoffene
- Kjent eller mistenkt genetisk predisposisjon for malign hypertermi, pasienter, eller pasienter med en kjent familieanamnese, med alvorlige bivirkninger etter administrering av inhalasjonsanestetika.

#### Sjekk også:

- Redusert bevissthet (også grunnet alkohol)
- Nedsatt nyrefunksjon
- At pasienten ikke er yngre enn 18 år gammel
- Nedsatt lunge- eller respirasjonsfunksjon
- Nedsatt leverfunksjon
- Siste administrasjon av metoksyfluran

**IKKE** gi metoksyfluran dersom pasienten har noen av tilstandene listet opp her eller bruker noen av legemidlene som er listet opp på baksiden.

Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på <https://relis.no/content/3557/Bivirkninger> og på [www.dmp.no/meldeskjema](http://www.dmp.no/meldeskjema)

## Instruer pasienten i riktig administrering av metoksyfluran.

**Påminnelse:** Les preparatomtalen før administrering og gi pasienten pakningsvedlegget. Sørg for at minste nødvendige dose administreres og at maksimum dose på 6 ml (2 x 3 ml flaske) ikke overskrides.

### Pasienten bruker ikke:

Induktorer av CYP 450-enzymene (f.eks. alkohol, isoniazid, fenobarbital, rifampicin, karbamazepin, efavirenz eller nevirapin). Antibiotika med kjent nefrotoksisk effekt (f.eks. tetrasyklin, gentamicin, kolistin, polymyxin B eller amfotericin B).

Samtidig bruk av metoksyfluran med CNS-depressiva kan forsterke depressive effekter og pasientene bør observeres nøye.

