

PASIENTKORT

- Rivaroxaban Sandoz 2,5 mg
- Rivaroxaban Sandoz 10 mg
- Rivaroxaban Sandoz 15 mg
- Rivaroxaban Sandoz 20 mg

(kryss av i boksen for å angi forskrevet dose)

- **Ha alltid dette kortet med deg.**
- **Vis alltid frem kortet til lege eller tannlege før du begynner på en behandling.**

Jeg bruker antikoagulasjonsbehandling med Rivaroxaban Sandoz (rivaroksaban).

Navn:

Adresse:

Fødselsdato:

Vekt:

Andre legemidler/forhold:

I nødstilfelle, vennligst informer:

Legens navn:

Legens telefon:

Legens stempel:

Vennligst informer også:

Navn:

Telefon:

Relasjon:

Informasjon til helsepersonell:

- INR-verdier skal ikke brukes da de ikke er egnet til å måle antikoagulerende aktivitet for Xarelto.

Hva bør jeg vite om Rivaroxaban Sandoz?

- Rivaroxaban Sandoz fortynner blodet, noe som forhindrer at du får farlige blodpropper.
- Rivaroxaban Sandoz må tas nøyaktig som legen din har fortalt deg. For å sikre maksimal beskyttelse mot blodpropper må du **aldri hoppe over en dose**.
- Du må ikke slutte å ta Rivaroxaban Sandoz uten å snakke med legen din først, fordi det kan øke risikoen for blodpropper.
- Rådfør deg med helsepersonell dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, før du begynner med Rivaroxaban Sandoz.
- Fortell helsepersonell at du bruker Rivaroxaban Sandoz før kirurgiske inngrep eller andre inngrep.

Når bør jeg rådføre meg med legen min?

Når du tar et blodfortynnende middel som Rivaroxaban Sandoz er det viktig å være oppmerksom på mulige bivirkninger. Blødning er den vanligste bivirkningen. Ikke begynn å ta Rivaroxaban Sandoz hvis du vet at du har risiko for blødninger, uten å rådføre deg med legen din først. Ta umiddelbart kontakt med legen din hvis du har noen tegn eller symptomer på blødning, som f.eks.:

- smerte
- hevelser eller ubehag
- hodepine, svimmelhet eller svakhet
- uvanlige blåmerker, neseblod, blødende tannkjøtt, kuttsår som det tar lang tid før stanser å blø
- kraftigere menstruasjon eller vaginalblødning enn vanlig
- blod i urinen som farger den rosa eller brun, rød eller svart avføring
- opphosting av blod eller oppkast av blod eller oppkast som ligner på kaffegrut.

Hvordan skal jeg ta Rivaroxaban Sandoz?

- For å sikre maksimal beskyttelse skal Rivaroxaban Sandoz
 - 2,5 mg tas med eller uten mat
 - 10 mg skal tas med eller uten mat
 - 15 mg skal tas sammen med mat
 - 20 mg skal tas sammen med mat