

Risiko for overfølsomhet for spor av kaninproteiner - forholdsregler for bruk

Pasientkort

Ruconest® (conestat alfa)

Risiko for overfølsomhet for spor av kaninproteiner - forholdsregler for bruk

Denne pasienten har fått foreskrevet Ruconest® for behandling av akutte anfall av arvet arvefølsomt angioødem. Ruconest® er en rekombinant human C1 esterasehemmer rensset fra melken til transgene kaniner, og inneholder spor av kaninproteiner. Før du starter behandlingen med Ruconest®, må du gjennomgå tidligere og nåværende medisinsk historie for å se om pasienten er allergisk mot kanin. Dersom det kan påvises eller er mistanke om kaninallergi, bør andre behandlingsalternativer vurderes.

Vennligst sørg for at følgende praksis alltid følges når du behandler denne pasienten:

1. Overvåk pasienten for kliniske tegn og symptomer på hypersensitivitet.
2. Gi øyeblikkelig medisinsk behandling dersom pasienten får anafylaktiske reaksjoner eller sjokk.
3. Informer pasienten om vanlige tegn på hypersensitive reaksjoner, som for eksempel elveblest, generalisert urtikaria, pustevansker, hvesing, hypotensjon og anafylaksi, og at de må varsle lege dersom noen av disse symptomene oppstår. Diskuter med pasienten hvordan dette er forskjellig fra et anfall av arvet arvefølsomt angioødem.
4. Informer med jevne mellomrom om at pasienten må melde fra ved eventuell allergisk reaksjon mot kanin.
5. Be pasienten om alltid å ha dette kortet på seg og å vise det til helsepersonell som behandler ham/henne for akutte anfall av arvet arvefølsomt angioødem.
6. Rapportert alle antatte tilfeller av overfølsomhet / immunologiske bivirkninger.

For mer informasjon, vennligst les informasjonsmaterialet og preparatomtalen (SPC) som kan søkes opp på Felleskatalogen.no, eller kontakt din lokale representant for Ruconest®:

Swedish Orphan Biovitrum AS
Tlf: 66 82 34 00
e-mail: mail.no@sobi.com

Jeg lider av hereditært angioødem (HAE)

Pasientnavn _____

Personnummer _____

Vekt _____

Min HAE-spesialist eller HAE-senter er

Navn _____

Telefon _____

Jeg er diagnostisert med hereditært angioødem (HAE) som manifester seg med gjentatte, ødematøse anfall på grunn av mangel på endogen C1 esterasehemmer. Hvis jeg ikke behandles riktig, kan HAE-anfallene være svært farlige for meg hvis den ødematøse hevelsen oppstår på steder som for eksempel orofarynx eller larynx (strupehodet).

Jeg kan bare motta Ruconest® hvis kaninallergi ikke kan påvises eller mistenkes.

Vennligst besøk legen din dersom du tror du har utviklet en allergi mot kanin. For mer informasjon, les pakningsvedlegget, det kan søkes opp på Felleskatalogen.no.



PHARMING

www.pharming.com

Swedish Orphan Biovitrum AS
Tlf: 66 82 34 00
e-mail: mail.no@sobi.com
www.sobi.com