

SIALANAR ORAL LØSNING

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FOR OMSORGSPERSONER

Viktig sikkerhetsinformasjon for omsorgspersoner

Sialanar (glykopyrronium) Oral løsning – dosering og håndtering av vanlige bivirkninger

Sialanars bivirkninger kan være doseavhengig og vanskelig å bedømme hos et funksjonshemmet barn. Ditt barns lege vil snakke med deg om vanlige bivirkninger som kan oppstå og hvordan man skal håndtere dem.

Det er viktig å sørge for at en nøyaktig dose gis hver gang, for å redusere skadelige virkninger av Sialanar som man har sett ved doseringsfeil eller overdose.

Hvordan du gir Sialanar

- Gi alltid Sialanar akkurat som legen har instruert. Du må ikke øke dosen uten legens tillatelse. Sjekk med legen din hvis du ikke er sikker.
- Gi Sialanar minst én time før eller to timer etter måltider. Hvis barnets spesifikke behov avgjør at samtidig administrasjon med mat er nødvendig, er det viktig å gi Sialanar til faste tider i tilknytning til matinntak. Ikke gi sammen med svært fettrik mat.
- Du må måle opp og kontrollere at dosen blir riktig med den spesielle sprøyten (oral sprøyte) som følger med pakningen. Dobbeltsjekk alltid at riktig volum av Sialanar er trukket opp i sprøyten. Instruksjoner om hvordan man bruker sprøyten ligger i pakningsvedlegget som følger legemiddelpakningen.
- Administrasjonstabellen på slutten av dette kortet skal utfylles av forskrivende lege på forhånd, og ved hver doseendring. Hensikten er å minne om riktig dose som skal gis til barnet.

Slik håndterer du bivirkninger

- Hvis noen av følgende bivirkninger oppstår må man slutte å gi Sialanar og oppsøke umiddelbar medisinsk veiledning;
 - Vanskeligheter med avføring (forstoppelse)
 - Vanskeligheter med urinavgang eller vanskeligheter med å få tømt blæren fullstendig (manglende urinavgang)
 - Alvorlig brystinfeksjon (lungebetennelse)
 - Allergisk reaksjon (utslett, kløe, rødt og hovent kløende utslett (elveblest) pustebesvær eller svelgebesvær, svimmelhet)
- Bivirkninger kan noen ganger være vanskelig å gjenkjenne hos pasienter med nevrologiske problemer som ikke kan uttrykke det de føler på en tilstrekkelig måte. Hvis du mener at en problematisk bivirkning oppstår etter økning av en dose, må du senke dosen til den forrige, og kontakte behandlende lege.
- Unngå å utsette pasienten for varmt eller svært varmt vær, på grunn av fare for overoppheting og heteslag. Sjekk med barnets lege i varme perioder eller hvis barnet har feber, for å se om dosen med Sialanar skal reduseres.
- Redusert spyttproduksjon kan føre til økt risiko for tannsykdom er daglig tannhygiene og jevnlig tannkontroll viktig.
- Sjekk barnets puls ved jevnlig mellomrom. Rådfør deg med barnets lege hvis hjerterytmen er svært langsom eller svært rask.
- Du må se etter endringer i barnets velvære eller adferd, og fortelle det til legen.

Tilleggsinformasjon

- Oppsøk umiddelbart medisinsk nødhjelp hvis barnet gis for mye Sialanar, selv om barnet ser ut til å ha det bra.
- Fortell barnets lege om det hvis barnet tar, nylig har tatt eller kanskje skal ta andre medisiner.
- Rådfør deg med barnets lege minst hver 3. måned for å sikre at Sialanar fortsatt er riktig for barnet.

Ytterligere informasjon om å ta Sialanar finner man i pakningsvedlegget og ved å snakke med barnets lege. Pakningsvedlegget kan søkes opp på Felleskatalogen.no
Se doseadministrasjonstabellen nedenfor for å finne riktig dose for ditt barn.

Doseringstabell:

Pasientnavn: _____ Fødselsdato: _____

Legens navn: _____

Legens kontaktdetaljer: _____

Dose forskrevet (skal fylles ut av lege):

Nr	Dose (ml)	Startdato (ddmmåå)	Sluttdato (ddmmåå)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

For mer detaljert informasjon om Sialanar kan du lese *Pasientinformasjonen*.

For mer informasjon eller forespørsler om Sialanar send e-post til:
info@frostpharma.com

Eier av markedsføringsautorisasjon:

Proveca Pharma Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irland.

Denne brosjyren ble sist revidert i april 2022.