

Behandelnde leges
telefonnummer: _____

Behandelnde leges navn: _____

Navn på legesenteret: _____

Dato for første forskrivning av teriflunomid: _____

Pasientens navn: _____

TERIFLUNOMIDE MYLAN PASIENTKORT

Dette pasientkortet inneholder viktig sikkerhetsinformasjon som du må kjenne til når du får behandling med teriflunomid. Vennligst les pakningsvedlegget nøye. Dette finner du i linken ([Teriflunomide Mylan Mylan - Felleskatalogen Pasientutgave](#))

Vennligst se også oppdatert preparatomtale (SPC) og opplæringsmaterieill på www.felleskatalogen.no. Bivirkninger bes meldes på elektronisk skjema til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding

Denne brosjyren er utviklet av markedsføringsinnehaver. Vis dette kortet til leger/helsepersonell som er involvert i den medisinske behandlingen din (spesielt i tilfelle medisinsk akuttbehandling og/eller dersom nye leger/helsepersonell blir involvert)

Viktige bivirkninger

Teriflunomid demper aktiviteten til immunsystemet. Hos noen pasienter kan teriflunomid gi leverskade (hepatitt), og det kan også redusere produksjonen av hvite blodceller som bekjemper infeksjoner (nøytrofiler) og blodplater som er involvert i blodkoagulering. Leverfunksjonen din og blodtrykket ditt bør kontrolleres regelmessig under behandling med teriflunomid, og full blodtelling bør utføres om nødvendig. Dette bør også kontrolleres før behandlingsstart.

Kontakt lege umiddelbart dersom du opplever noen av følgende bivirkninger:

- Gulfarging av huden og det hvite i øynene (gulsott), kvalme eller oppkast uten forklaring, magesmerter eller mørkere urin enn normalt. Dette kan være tegn på at du har problemer med leveren.
- Tegn på infeksjon, slik som smerter ved vannlatning, forvirring, feber, hoste, hovne lymfeknyter

Informasjon til kvinner som kan bli gravide, inkludert jenter og deres foreldre/omsorgspersoner:

- Ikke start behandling med Teriflunomide Mylan (teriflunomid) dersom du er gravid eller du tror du kan være gravid. Legen kan be deg om å ta en graviditetstest for sikkerhets skyld.
- Bruk sikker prevensjon mens du bruker Teriflunomide Mylan (teriflunomid). Legen vil sørge for rådgivning om de potensielle risikoene for fosteret og om behovet for sikker prevensjon.
- Kontakt legen om du vil endre prevensjonsmetode eller om du vil bli gravid etter at behandlingen med Teriflunomide Mylan (teriflunomid) er avsluttet. Du bør også snakke med legen hvis du ammer eller planlegger å amme.
- Hvis du mistenker at du er gravid mens du tar Teriflunomide Mylan (teriflunomid) eller i løpet av to år etter at behandlingen er avsluttet må du ta kontakt med lege umiddelbart for en graviditetstest. Dersom testen viser at du er gravid kan legen foreslå behandling med visse legemidler som fjerner Teriflunomide Mylan (teriflunomid) raskt fra kroppen. Dette kan redusere risikoen for barnet ditt.
- For foreldre/omsorgspersoner til jenter: vennligst kontakt legen når pasienten får menstruasjon for første gang for å få rådgivning om de potensielle risikoene for fosteret ved en eventuell graviditet og behovet for prevensjon.