



## Pasientkort

Sikkerhetsinformasjon til pasienter Vennligst husk alltid å ha dette kortet med deg.

### Viktig sikkerhetsinformasjon til helsepersonell

**Tolvaptan Teva B.V. kan forårsake leverskade.** Testing av leverfunksjon skal utføres regelmessig (månedlig i de første 18 månedene, deretter hver 3. måned). Ved tegn på leverskade eller unormal økning av ALAT og ASAT skal behandling med Jinarc umiddelbart avsluttes.

**Tolvaptan Teva B.V blokkerer virkningen av vasopressin i nyrene, og kan forårsake stort urinvolum og kraftig dehydrering.**

Symptomer på dehydrering kan omfatte økt tørste, munntørrehet, tretthet, lavere urinproduksjon, hodepine, tørr hud, kløe, økt hjerterytme og forvirring.

### Viktig sikkerhetsinformasjon for pasienter

**Tolvaptan Teva B.V kan påvirke måten leveren din fungerer på**

Rådfør deg med lege hvis du opplever symptomer på tretthet, nedsatt appetitt, magesmerter, feber, mørk urin, gulfarge i hud eller øyne (gulsott), kraftig dehydrering, kvalme, oppkast, kløe eller ledd- og muskelsmerter med feber.

**Tolvaptan Teva B.V kan forårsake kraftig dehydrering**

Drikk rikelig væske for å unngå dehydrering. Rådfør deg med lege hvis du ikke får i deg nok væske via munnen.

Besøk [www.felleskatalogen.no](http://www.felleskatalogen.no) for mer informasjon.

Pasientens navn: \_\_\_\_\_

Dato for første foreskrivning af Tolvaptan Teva B.V. \_\_\_\_\_

Legens navn: \_\_\_\_\_

Sykehusets navn: \_\_\_\_\_

Sykehusets telefonnummer: \_\_\_\_\_