

Hva bør jeg vite om Xarelto?

- ◆ Xarelto fortynner blodet, noe som forhindrer at du får farlige blodpropper.
- ◆ Xarelto må tas nøyaktig som legen din har fortalt deg. For å sikre maksimal beskyttelse mot blodpropper må du **aldri hoppe over en dose**.
- ◆ Du må ikke slutte å ta Xarelto uten å snakke med legen din først, fordi det kan øke risikoen for blodpropper.

◆ Rådfør deg med helsepersonell dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, før du begynner med Xarelto.

◆ Fortell helsepersonell at du bruker Xarelto før kirurgiske inngrep eller andre inngrep.

Når bør jeg rådføre meg med legen min?

Når du tar et blodfortynnende middel som Xarelto er det viktig å være oppmerksom på mulige bivirkninger. Blødning er den vanligste bivirkningen. Ikke begynn å ta Xarelto hvis du vet at du har risiko

for blødninger, uten å rådføre deg med legen din først. Ta umiddelbart kontakt med legen din hvis du har noen tegn eller symptomer på blødning, som f.eks.:

- ◆ smerte
- ◆ hevelser eller ubehag
- ◆ hodepine, svimmelhet eller svakhet
- ◆ uvanlige blåmerker, neseblod, blødende tannkjøtt, kuttsår som det tar lang tid før stanser å blø
- ◆ kraftigere menstruasjon eller vaginalblødning enn vanlig
- ◆ blod i urinen som farger den rosa eller brun, rød eller svart avføring

◆ opphosting av blod eller oppkast av blod eller oppkast som ligner på kaffegrut

Hvordan skal jeg ta Xarelto?

- ◆ For å sikre maksimal beskyttelse skal Xarelto
 - 2,5 mg tas med eller uten mat
 - 10 mg skal tas med eller uten mat
 - 15 mg skal tas sammen med mat
 - 20 mg skal tas sammen med mat.

88287355

NO

Pasientkort



Xarelto® 2,5 mg
Xarelto® 10 mg
Xarelto® 15 mg
Xarelto® 20 mg

- ◆ Ha alltid dette kortet med deg.
- ◆ Vis alltid frem kortet til lege eller tannlege før du begynner på en behandling.

Jeg bruker antikoagulasjonsbehandling med Xarelto (rivaroksaban).

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Navn: _____ | Andre legemidler/forhold: _____ |
| Adresse: _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| Fødselsdato: _____ | Vekt: _____ |
| _____ | _____ |

I nødstilfelle, vennligst informer:

Legens navn: _____

Legens telefon: _____

Legens stempel: _____

Vennligst informer også:

Navn: _____

Telefon: _____

Relasjon: _____

Informasjon til helsepersonell:

- ◆ INR-verdier skal ikke brukes da de ikke er egnet til å måle antikoagulerende aktivitet for Xarelto.

